Tema 9. La integral simple de Riemann

- Calcular las siguientes integrales con ayuda de las fórmulas del área de las figuras planas (triángulos, círculos, etc.):
 - $\int_1^2 (2x+1)dx$,
 - $\int_{-3}^3 \sqrt{9-x^2} dx$.
- Calcula las siguientes integrales mediante la regla de Barrow:
 - $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{1+x^2} dx$,
 - $\int_{-3}^{-2} \frac{1}{x^2-1} dx$,
 - $\int_0^{\pi/2} \sin 2x dx$,
 - $\int_{-2}^{-1} \frac{1}{(11+5x)^3} dx$.
- Calcula el área de cada uno de los siguientes recintos planos limitados por:
 - el eje de abscisas y una semionda de la senoide $y = \sin x$.
 - las rectas verticales $x = 0$ y $x = 2$, y las curvas $y = 2^x$ e $y = 2x - x^2$.
 - las parábolas $x = -2y^2$ y $x = 1 - 3y^2$.
- ¿Es cierto que el área bajo la gráfica de $y = x - 1$, hasta el eje de abscisas, en $[0, 3]$ es el número $\int_0^3 (x-1)dx$?
- Calcula las siguientes integrales: $\int_{-1}^2 \frac{|x|}{x} dx$, $\int_0^{\pi} \sqrt{\frac{1+\cos 2x}{2}} dx$.
¿Qué propiedad de la integral de Riemann has necesitado aplicar?
- Calcula el área de la región plana limitada por las parábolas $y = x^2$ e $y = \frac{x^2}{2}$, y por la recta $y = 2x$.
- Usa la integración por partes para calcular $\int_0^{\pi} (x \cdot \sin x) dx$.
- Realiza el cambio de variable adecuado para calcular cada una de las siguientes integrales:
 - $\int_0^{1/2} \sqrt{1-x^2} dx$,
 - $\int_0^1 \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx$,
 - $\int_0^{\pi/2} \frac{1+\sin x}{1+\cos x} dx$.
- Calcula el área del segmento del círculo, centrado en el origen O y de radio 2, situado a la derecha de la recta vertical $x = \sqrt{2}$.
- Calcula las integrales $\int_{-1}^1 x^2 dx$, $\int_{-3}^3 xe^{-x^2} dx$, $\int_{-\pi}^{\pi} x \sin x dx$, $\int_{-\pi}^{\pi} x \cos x dx$, $\int_0^{100\pi} \sqrt{1-\cos 2x} dx$ y $\int_{-\pi/3}^{5\pi} \max\{\sin x, 0\} dx$ aplicando las propiedades de la integral de funciones simétricas y de funciones periódicas.
- ¿Por qué es correcta la igualdad: $\int_{-99}^{99} (ax^3 + bx^2 + cx) dx = 2 \int_0^{99} bx^2 dx$?
- ¿Cuál es el valor medio de la función $f(x) = x$ en el intervalo $[-1, 1]$? ¿Y el de la función $f(x) = x^2$ en el intervalo $[-1, 1]$?
- Calcula el área bajo la curva $y = \sin^2 x$, hasta el eje de abscisas, entre $x = 0$ y $x = \pi$. ¿Cuál es el valor medio de esta función en el intervalo $[0, \pi]$?
- Considera una corriente alterna de intensidad $i(t) = i_0 \sin \omega t$.

 - Calcula la intensidad media en un semiciclo y en un ciclo.
 - Calcula la intensidad eficaz en un ciclo, sabiendo que la intensidad eficaz es el valor medio cuadrático de la intensidad: $I_{ef} = \left[\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt \right]^{1/2}$

- c) Si la corriente $i(t)$ pasa a través de un circuito de resistencia R , entonces la energía disipada, en forma de calor, en un intervalo de tiempo $[t_1, t_2]$ es

$W = R \int_{t_1}^{t_2} i^2(t) dt$. Comprueba que la intensidad eficaz I_{ef} , antes calculada, es la intensidad de una corriente continua que disipa en un ciclo la misma energía que la alterna $i(t) = i_0 \text{sen} \omega t$.

15. Calcula la derivada de las siguientes integrales cuyo extremo superior de integración es variable:

$$g(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt;$$

$$h(x) = \int_{-1}^x U(t) dt, \text{ donde } U(t) \text{ es la función salto unitario;}$$

$$v(x) = \int_a^{2x} \cos t^2 dt.$$