

AUTOEVALUACIÓN TALLER SUTURAS

1. Respecto a la clasificación de los desgarros perineales, señale la opción correcta:

- a. El desgarro de segundo grado incluye la musculatura perineal sin afectar al esfínter anal**
- b. El desgarro de tipo 3c compromete únicamente la mucosa rectal
- c. El desgarro 3a afecta más del 50% del esfínter anal externo
- d. Los desgarros de cuarto grado no requieren antibióticos profilácticos
- e. Los desgarros de primer grado afectan exclusivamente al esfínter anal externo

2. En relación al punto de colchonero vertical (Blair Donati), ¿cuál es su principal ventaja?

- a. Indicado en heridas infectadas
- b. Favorecer la eversión de bordes y distribuir tensión**
- c. Mejor resultado estético en el plano cutáneo
- d. Mayor rapidez en su ejecución
- e. Reducción del sangrado profundo

3. Durante la histerorrafia postcesárea, ¿qué técnica es la más recomendada actualmente?

- a. Sutura discontinua transfixiante en dos planos
- b. Cierre continuo transfixiante en dos capas
- c. Cierre en un único plano no transfixiante con sutura reabsorbible**
- d. Sutura intradérmica con puntos separados
- e. Cierre cruzado en “X” con monofilamento

4. ¿Cuál es el principal objetivo de la sutura del tejido celular subcutáneo tras una cesárea cuando supera los 2 cm?

- a. Facilitar la adhesión peritoneal
- b. Reducir el riesgo de hematoma o seroma**
- c. Prevenir la eversión de los bordes cutáneos
- d. Evitar la necesidad de drenes
- e. Mejorar el resultado estético de la cicatriz

5. En la reparación de un desgarro de cuarto grado, ¿cuál es el primer paso técnico tras identificar la lesión?

- a. Sutura del músculo elevador del ano
- b. Cierre de mucosa vaginal
- c. Cierre de la mucosa rectal con puntos sueltos de Vycril**
- d. Suturar fascia abdominal
- e. Reconstrucción del esfínter anal en superposición